

ข้อควรระวังหลังฉีดฟิลเลอร์

— ข้อควรระวังหลังการทำหัตถการ

1. กรุณารับประทานยาที่โรงพยาบาลจัดให้เป็นเวลา 3 วันหลังทำหัตถการ
 2. หลังทำหัตถการอาจมีอาการบวมมากกว่าปกติ และในบางกรณีอาจมีรอยช้ำ ซึ่งจะค่อย ๆ จางลงภายใน 1-2 สัปดาห์
 3. หากฉีดฟิลเลอร์บริเวณหน้าผาก ควรงดสวมหมวกเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์
 4. หากฉีดฟิลเลอร์บริเวณจมูก ควรงดสวมแว่นตาเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์
 5. หากฉีดฟิลเลอร์บริเวณริมฝีปาก ควรงดใช้หลอดดูดน้ำเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 6. หากบริเวณที่ทำหัตถการหรือบริเวณใกล้เคียงมีอาการบวมแดงร้อนร่วมกับอาการปวดรุนแรง ควรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที
 7. ภายใน 2 สัปดาห์ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กระตุ้นผิวบริเวณที่ทำหัตถการ เช่น ชวน้ำ ห้างอบไอน้ำ การสครับผิว และการนวด
 8. ในวันทำหัตถการ ควรหลีกเลี่ยงการล้างหน้า การแต่งหน้า และการโกนหนวด
 9. ภายใน 1 สัปดาห์ ควรงดการออกกำลังกายหนัก ดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
 10. หากมีข้อสงสัยหรืออาการผิดปกติ กรุณาติดต่อโรงพยาบาลหรือเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติม
- หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ (+82-10-2524-1298)**

