ข้อควรระวังหลังฉีดฟิลเลอร์

ข้อควรระวังหลังการทำหัตถกา

1. กรุณารับประทานยาที่โรงพยาบาลจัดให้เป็นเวลา 3 วันหลังทำหัตถการ
2. หลังทำหัตถการอาจมีอาการบวมมากกว่าปกติ และในบางกรณีอาจมีรอยช้ำ ซึ่งจะค่อย ๆ จางลงภายใน 1–2 สัปดาห์
3. ากฉีดฟิลเลอร์บริเวณหน้าผาก ควรงดสวมหมวกเป็นเวลา 2–4 สัปดาห์
4. ากฉีดฟิลเลอร์บริเวณจมูก ควรงดสวมแว่นตาเป็นเวลา 2–4 สัปดาห์
5. ากฉีดฟิลเลอร์บริเวณริมฝีปาก ควรงดใช้หลอดดูดน้ำเป็นเวลา 1 สัปดาห์
6. ากบริเวณที่ทำหัตถการหรือบริเวณใกล้เคียงมีอาการบวมแดงร้อนร่วมกับอาการปวดรุนแรง ควรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที
7. ายใน 2 สัปดาห์ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กระตุ้นผิวบริเวณที่ทำหัตถการ เช่น ซาวน่า ห้องอบไอน้ำ การสครับผิว และการนวด
8. ในวันทำหัตถการ ควรหลีกเลี่ยงการล้างหน้า การแต่งหน้า และการโกนหนวด
9. ายใน 1 สัปดาห์ ควรงดการออกกำลังกายหนัก ดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
10. ากมีข้อสงสัยหรืออาการผิดปกติ กรุณาติดต่อโรงพยาบาลหรือเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ (+82-10-2524-1298)